

104 bd Raymond Poincaré – 92380 Garches

Pôle Médecine spécialisée -
Infection - Inflammation

Chef de Pôle
Pr Christian PERRONNE
Secrétariat : F. KOSTAS - 01 47 10 77 58

Cadre Paramédical de Pôle
Jean Marie CABARET

Cadre Administratif de Pôle
Santine FRENI

ATTESTATION

Département de Médecine Aiguë
Spécialisée
Hospitalisation 33 (0)1 47 10 77 74
Fax hospitalisation 33 (0)1 47 10 77 90
Consultation 33 (0)1 47 10 77 52
Hôpital de jour 33 (0)1 47 10 77 70

Unité d'Infectiologie
Pr C. PERRONNE
Pr A.C. CREMIEUX
Dr A. DINH
Dr B. DAVIDO
Secrétariats :
01 47 10 77 60 ou 01 47 10 44 32

Unité de Nutrition Clinique
Pr J.C. MELCHIOR
Dr P. CRENN
Dr M. HANACHI-GUIDOUM
Secrétariat : 01 47 10 46 67

Unité Ambulatoire
Pr J. LEIBOWITZ
Pr J.M. NORES
Dr P. DE TRUCHIS
Dr D. MARIGOT-OUTTANDY
Dr D. LE DÙ
Secrétariat : 01 47 10 77 72
Dr C. SCHMIT
Médecine des Voyages et
Vaccinations Internationales
(Fièvre jaune) : 01 47 10 77 52 ou 53

Chefs de Clinique - Assistants
Dr M. DEVAUX
Dr M. GOSSET
Dr I. PIERRE

Cadres
Marine BOUVIER
Sophie DE PASQUALE
01 47 10 46 49


Assistantes Sociales
01 47 10 77 44
01 47 10 77 69

Psychologue
Vanessa BERDUGO
01 47 10 79 00 poste 3207

Technicienne d'Etudes Cliniques
Huguette BERTHE
01 47 10 46 65

Je soussigné Professeur Christian PERRONNE, certifie, après une analyse exhaustive de la littérature que certaines recommandations internationales et nationales reposent sur des avis d'experts et ne sont pas basées sur les données scientifiques publiées. La mauvaise sensibilité des sérologies de *Borrelia* est largement publiée dans la littérature médicale depuis 20 ans, y compris dans les plus grands journaux. Il s'agit d'un fait établi. La persistance de *Borrelia burgdorferi* dans les tissus de l'organisme, après des traitements antibiotiques de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, a également été rapportée dans la littérature dans plusieurs publications dans différentes espèces animales et chez l'homme. L'efficacité du traitement antibiotique prolongé a été montrée dans plusieurs études ouvertes. Plusieurs études randomisées ont montré un effet significatif antibiotique contre placebo. Une seule étude randomisée n'a pas retrouvé de différence mais cette étude présentait de nombreux biais méthodologiques. En conséquence, il est urgent de mettre en place des nouvelles techniques diagnostiques et de faire avancer la recherche clinique sur les modalités thérapeutiques car le déni actuel de la maladie fait que un nombre considérable de patients n'a pas accès au traitement dès lors que la symptomatologie de leur maladie persiste après les traitements habituels recommandés.

Certificat fait à Garches, 19 juin 2013,



Pr C. PERRONNE